

این پمفلت در مورد هیدروسل و آنچه که باید قبل و بعد از عمل انجام دهید، اطلاعاتی را به شما می دهد.

هیدروسل چیست؟

"هیدرو" به معنی آب و "سل" به معنی کیسه است. پس هیدروسل یعنی کیسه آب، که آب آوردن بیضه هم گفته می شود. یعنی اطراف بیضه را مایع شفاف می گیرد. معمولاً یک طرفه هست ولی ممکن است دو طرفه هم باشد. هیدروسل در نوزادان و در سمت راست بیشتر دیده می شود.

علت هیدروسل چیست؟

- بیضه ها در ابتدا در شکم تشکیل می شوند و قبل از تولد از طریق لوله ای به داخل کیسه بیضه حرکت می کنند.
- مایعات شکم از طریق این لوله وارد کیسه بیضه می شوند تا زمان تولد این لوله بسته میشود اما گاهی باز می ماند و مایع داخل کیسه جمع میشود.
- اگر لوله باز باشد مایع داخل کیسه می تواند به جلو و عقب حرکت کند.
- ممکن است هیدروسل در اثر ضربه هم بوجود بیاید.
- ممکن است در اثر عفونت هم بوجود بیاید.
- اگر نوزاد نارس یا کم وزن باشد.
- تومورها هم می توانند باعث هیدروسل شوند.

علائم و نشانه ها:

تورم در ناحیه بیضه که گاهی با درد همراه است.

چطور تشخیص داده می شود؟

- معاینه توسط پزشک
 - سونوگرافی
 - تاریخچه پزشکی و آزمایشات
- گاهی ورم کیسه در اثر فتق اتفاق می افتد و فتق باعث هیدروسل می شود. پزشک، کودک شما را از نظر فتق هم معاینه می کند.

چگونه درمان می شود؟


- گاهی هیدروسل خود به خود خوب می شود اگر در طول روز اندازه کیسه بیضه تفاوتی نکند و با زور زدن بچه بزرگتر نشود در ۶ تا ۱۲ ماه اول زندگی، خود به خود از بین می رود و به اقدام خاصی نیاز ندارد.
- ولی اگر پس از ۱ یا ۱/۵ سالگی از بین نرفت نیاز به عمل جراحی دارد. اگر فتق هم اتفاق افتاده لازم است جراحی انجام شود.
- اگر اندازه کیسه بیضه در ساعات اولیه روز کوچک بوده و با شروع فعالیت کودک پس از چند ساعت اندازه کیسه بزرگتر شود و دوباره پس از استراحت کوچکتر شود حتماً به پزشک مراجعه کنید چون کودک شما نیاز به عمل جراحی دارد.
- اگر علت عفونت باشد داروی آنتی بیوتیک شروع می شود.

برای بستری کردن کودکم چه کاری باید انجام دهم؟

پس از مراجعه به پزشک و تشخیص نیاز به عمل، پزشک دو برگ بستری می نویسد و شما برگ بستری را به بخش جراحی می برید تا نوبت عمل تعیین شود.

عمل جراحی چگونه انجام می شود؟

بیهوشی کودک شما از نوع بیهوشی عمومی است. جراح یک برش کوچکی زیر شکم ایجاد می کند و لوله باز شده به شکم را می بندد. عمل ۱ تا ۱/۵ ساعت طول می کشد و معمولاً ۲ یا ۳ ساعت طول می کشد تا کودک شما کاملاً بیدار شود.



محل برش جراحی

چه وقت کودک مرخص می شود؟

اگر بتواند به خوبی مایعات بخورد، استفراغ نداشته باشد ضربان قلب و تنفسهای طبیعی داشته باشد، ادرار کرده باشد و محل عمل هم خونریزی نداشته باشد می تواند مرخص شود.



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشتی ریاست جمهوری

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذری

راهنمای والدین

هیدروسل (آب آوردگی بیضه)



آموزش سلامت

تهیه و ترجمه: کافیه اصلانی - ناهید دهخدا

مشاور: دکتر داوود بادبرین (@dr.badbarin)


تاریخ تهیه: ۸۸/۰۵

آخرین بازنگری: ۱۴۰۱/۰۴



برای دانلود پمفلت
کد را اسکن نمایید.

- از محل زخم ترشح چرکی دارد.
- قسمت زیادی از اطراف زخم قرمز شده است.
- در طول ۱۲ ساعت ادرار نداشته است.
- مرتب استفراغ می کند.
- اگر در طول روز، ورم کیسه تغییر می کند.
- اگر در کشاله ران هم ورم دارد.
- بطور مداوم گریه می کند.
- کیسه بیضه دردناک است.
- کیسه بیضه قرمز شده، بزرگتر و سفت تر است.
- در موقع لمس کردن حسایت و درد داشته باشد.



«این پمفلت به عنوان راهنمای آموزشی والدین می باشد.
واحد آموزش سلامت تلاش می کند اطلاعات به روز و دقیقی در اختیار
بیمار و خانواده قرار دهد.
اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتماً با پزشک کودک مشورت کنید.»
یا با شماره تلفن ۰۴۱۳۱۵۹۲۲۹۸ تماس بگیرید.

منبع:

Clinical key, Patient Education:
Hydrocele, Pediatric
Elsevier Interactive Patient Education © 2019 Elsevier Inc..

بعد از عمل چگونه از کودکم مراقبت کنم؟

دارو: کودک شما ممکن است چند روز اول بعد از عمل به مسکن نیاز داشته باشد که توسط جراح نسخه می شود معمولاً در این عمل نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک (داروی چرک) نیست. اگر آنتی بیوتیک لازم باشد جراح نسخه می کند و همه دارو باید داده شود حتی اگر حال فرزندتون بهتر شده باشد.

تغذیه: کودک شما همه چیز می تواند بخورد ولی بهتر است مایعات بیشتری داده شود.

فعالیت: از دوچرخه سواری و شنا به مدت دو هفته خودداری کند.

حمام دادن: ۴۸ ساعت بعد از عمل، می تواند حمام کند.

پانسمان: ۴۸ ساعت بعد از عمل پانسمان اولیه برداشته شود و دیگر نیازی به پانسمان دوباره نیست.

بخیه ها: ۷ الی ۱۰ روز بعد از عمل بیمار توسط جراح ویزیت می شود و بخیه ها برداشته می شود.

توجه

در موارد زیر سریع به پزشک مراجعه کنید:

- اگر درد دارد و با مسکن بهتر نمی شود.
- تب بالای ۳۸ درجه دارد.
- از محل عمل خونریزی دارد و با پنج دقیقه فشار مستقیم روی محل خونریزی قطع نمی شود.