

آندوسکوپي چیست ؟

- آندوسکوپي روش تشخیصی و درمانی برای مشاهده اجزای داخل بدن می باشد که در بررسی ضایعات مری، معده، مشکلات بلع، دردهای شکمی، خونریزی های معده، بررسی سوء جذب، درآوردن جسم خارجی، بدخیمی ها، استفرغهای مکرر و عفونت ها و نهایتا در تشخیص یا درمان بیماری می تواند کمک کننده باشد.


آندوسکوپ چیست ؟

- آندوسکوپ لوله نازک نرمی است که یک دوربین بسیار کوچک در انتهای خود دارد و پزشک آن را از طریق دهان به قسمت فوقانی دستگاه گوارش وارد می کند
- پزشک بوسیله این دستگاه داخل دستگاه گوارش (مری- معده و قسمت ابتدایی روده کوچک) را بر روی صفحه مانیتور مشاهده می کند و در صورت وجود بافت مشکوک در حین انجام آن ممکن است نمونه ای از دستگاه گوارش را برداشته و به آزمایشگاه بفرستند.

آیا زمان انجام آندوسکوپي کودک من درد خواهد

داشت؟

- قبل از انجام آندوسکوپي به کودک شما دارویی داده می شود که او را به حالت خواب می برد و علاوه بر آن گلوله کوچکی هم با اسپری بی حس کننده کاملاً بی حس می شود.
- با دریافت این دارو مطمئن باشید که کودک شما دردی حس نخواهد کرد و حتی در اکثر موارد این دارو کمک می کند که کودک شما ترس هنگام آندوسکوپي را هم فراموش کند.
- پزشک ممکن است که از مخاط دستگاه گوارش نمونه برداری هم انجام بدهد که این هم اصلاً دردناک نخواهد بود.



قبل از انجام آندوسکوپي چه باید کرد؟

- بر اساس سن کودکان پزشک به شما می گوید که از چه ساعتی به کودکان هیچ غذا و مایعات (حتی شیر) ندهید و معده کودکان را برای بررسی دقیق تر کاملاً خالی نگه دارید.
- اگر کودک شما سابقه حساسیت به دارو و آرامبخش دارد قبل از انجام پزشک و پرستار آن را باخبر کنید.

حین آندوسکوپي چه باید کرد؟

- شما می توانید تا زمانی که کودکان داروی آرامبخش دریافت میکند کنار کودکان بمانید و زمان شروع انجام آندوسکوپي اتاق را ترک کنید.
- اگر حین بررسی نمونه برداری شده باشد نمونه به پاتولوژی ارسال خواهد شد ۱۵-۲۰ روز بعد جواب پاتولوژی را از بخش بستری یا در صورت پذیرش سرپایی از پاتولوژی پیگیری کنید و تحویل بگیرید و به رویت پزشک گوارش برسانید



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذری
راهنمای والدین

آندوسکوپي



آموزش سلامت

تهیه و ترجمه: نیر محرمی

کارشناس ارشد پرستاری

مشاور: دکتر رقیه فرجی، فوق تخصص گوارش کودکان

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱

آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۲



مرکز کودکان زهرا مردانی آذری

با دیدن چه علائمی سریعاً باید پزشک و پرستار تان را خبردار کنید؟

- اگر درد کودکان کم نشده و یا افزایش داشته باشد.
- احساس سوزش گلو در کودکان ادامه داشته باشد.
- اگر کودک شما پس ۳-۱ ساعت توانایی بلع (قورت دادن) را به دست نیاورد.
- اگر سرفه و استفراغ به همراه با خون زیاد بعد از انجام آندوسکوپي در کودکان دیدید.
- اگر کودک شما تب کرد.
- اگر مدفوع کودک شما سیاه یا قهوه‌ای بود.
- اگر بدن کودکان به داروی آرام بخش حساسیت نشان بدهد.

بیان این عوارض به این معنا نیست که کودک شما دچار این عوارض خواهد شد؛ چون در درصد کمی از کودکان این عوارض مشاهده شده است و در ضمن کادر مجرب و دوره دیده در کنار پزشک بر بالای سر کودک شما در طول آندوسکوپي حضور دارند و در صورت بروز احتمالی عوارض اقدامات لازم را سریعاً انجام می‌دهند.

"این پمفلت به عنوان راهنمای آموزشی والدین می باشد. واحد آموزش سلامت تلاش می کند اطلاعات به روز و دقیقی در اختیار بیمار و خانواده قرار دهد. اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتماً با پزشک کودک مشورت کنید." یا در ساعت اداری با شماره تلفن ۳۱۵۹۱۵۲۸ بخش اتاق عمل سرپایی تماس بگیرید.

منابع:

۱. کتاب پرستاری کودکان ونگ ۲۰۲۴

پس از انجام آندوسکوپي چه کاری باید انجام بدهم؟

- کودکان بعد از اتمام آندوسکوپي به اتاق ریکاوری منتقل می شود و تا هوشیاری کامل تحت مراقبت تکنسین بیهوشی خواهد بود و معمولاً تا ۱ الی ۲ ساعت پس از انجام آندوسکوپي طول می کشد تا تاثیر داروی خواب آور از بین برود و کودکان بیدار شود.
- زمانی که کودک بتواند به صورت کامل بلع کند (قورت دهد) با راهنمایی تکنسین بیهوشی مایعات به کودکان خواهید داد. اگر کودک شما احساس ناراحتی یا سوزش در گلو داشت با مایعات خنک شروع کنید.
- بعد از ترخیص ابتدا میان عده سبک بخورد و سپس میتوانید طبق روال قبل به کودک غذا بدهید مگر اینکه پزشک و پرستار محدودیت غذایی یا رژیم غذایی خاص به شما توصیه کند.
- احتمال خشونت صدا و درد گلو تا ۲-۱ روز وجود دارد برای بهبودی درد گلو مایعات خنک و غذای نرم بدهید.
- بعد از اتمام آندوسکوپي ممکن است پزشک توضیح مختصری از مشاهده خود در دستگاه گوارش کودکان به شما بدهد و جواب نهایی بعد از آماده شدن به شما داده خواهد شد.