

این پمفلت اطلاعات لازم درباره عوارض داروهای ضد تشنج به شما ارائه می دهد تا با شناخت کامل عوارض بتوانید مراقبت بهتری از فرزندتان داشته باشید.

آیا داروهای ضد تشنج هم عوارض دارند؟
مانند تمام داروها، داروهای ضد تشنج می توانند عوارض ایجاد کنند، عوارض جانبی احتمالی داروهای ضد تشنج می توانند بر انتخاب نوع دارو تاثیر بگذارند.

چه وقت بهترین زمان مناسب برای مصرف دارو ضد تشنج است؟
داروهای ضد تشنج باید به طور مرتب در هر روز مصرف شوند.

برای اکثرا داروهای ضد تشنج زمان مصرف صبح یا عصر فرقی نمی کند، فقط بهتر است روزانه در یک زمان مشخص و به طور منظم مصرف شوند، این امر باعث می شود تا سطح بدن در یک وضعیت مطلوبی قرار گیرد و از بروز تشنج جلوگیری شود.

فرزندم داروهای ضد تشنج را تا کی باید مصرف کند؟

بیشتر کودکان تا ۲ سال و برخی تا پایان عمر باید از داروهای ضد تشنج استفاده کنند.

برخی از داروهای ضد تشنج به عنوان خط اول درمانی محسوب می شوند اما برخی دیگر در صورت نیاز به کنترل بیشتر، به عنوان مواد افزودنی یا داروی جانبی تجویز می شوند.

رایج ترین داروهای ضد تشنج کدامند؟
درمان اولیه برای تشنج ژنرالیزه (کل بدن) و تونیک و کلونیک (سفت و شل شدن اندامها) شامل فنوباربیتال، سدیم والپروات، لاموتریژن، توپیرامات و کلوبازام می باشند.

برای تشنج های فوکال (یک قسمت از بدن) بیشتر از داروهای فنی تویین و کاربامازپین استفاده می شود و

برای اسپاسم شیرخوارگی از سابریل و تتراکوزاکتاید استفاده می شود.

چه مقدار از دارو می تواند عارضه ایجاد کند؟
عوارض جانبی آنها بسته به مقدار مصرف دارو هنگامی رخ می دهد که مقدار دارو بیش از حد زیاد باشد، در این صورت عوارض جانبی معمولاً در صورت کاهش مقدار از بین می رود به همین دلیل معمولاً مصرف داروها با مقدار کم شروع و به تدریج افزایش می یابد.

چرا تشخیص عوارض در کودکان مشکل است؟
تشخیص عوارض جانبی در نوزادان و کودکان و افراد دارای اختلال یادگیری دشوار است،

این افراد نمی توانند احساس خودشان را بیان کنند اگر کودکی با مصرف این داروها احساس ناخوشایندی داشته باشد ممکن است والدین متوجه تغییر رفتار او شده و بلافاصله باید پزشک معالج خود را مطلع سازند.

بعضی از عوارض شایع داروهای ضد تشنج را برایتان بازگو میکنیم تا در صورت ایجاد این عوارض و بروز مشکل به پزشک معالج خود مراجعه کنید.

➤ فنوباربیتال: حساسیت پوستی که به صورت بثورات جلدی (نقطه های ریز قرمز)، در کل بدن ظاهر می شود که در ابتدا کم و سپس به سرعت افزایش می یابد و ممکن است به دنبال آن تب نیز بروز کند. عدم تعادل، خواب آلودگی، بی قراری

➤ فنی تویین: بی نظمی ضربان قلب که به صورت بی قراری بروز می کند، هیپر تروفی لته ها (پرخونی لته ها)



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذری

راهنمای والدین

توجهات داروهای ضد تشنج



آموزش سلامت

تهیه و ترجمه: رویا یوسفی، ناهید دهخدا

کارشناس ارشد پرستاری

مشاور: دکتر پری ناز حبیبی، دکتر بیتا پور شیری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱

توصیه های پزشک معالج

این پمفلت به عنوان راهنما می باشد.
واحد آموزش سلامت تلاش می کند اطلاعات به روز و دقیقی در اختیار
بیمار و خانواده قرار دهد.

اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتما با پزشک کودک مشورت کنید.»

اگر شما توصیه ها یا اطلاعات بیشتری نیاز دارید با شماره
تلفن ۳۱۵۹۵۲۴۰ بخش اعصاب تماس بگیرید.

وب سایت بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذری:

<https://mardaniazari.tbzmed.ac.ir>

منابع:

کتاب داروهای ژنریک ۱۴۰۲

**هرگونه استفاده از این مطالب منوط به رعایت حقوق
مؤلفین و ذکر منبع می باشد**

➤ سابریل و کلوبازام: افزایش بزاق و اختلال در
بلع

➤ سدیم والپروات: دردهای شکمی و استفراغ
و گاهی افزایش آنزیم های کبدی و کاهش
پلاکت خون

➤ توپیرامات: اختلال حرکتی، دوبینی و
سنگهای کلیوی.

➤ ریسپریدون، خواب آلودگی، افزایش وزن
و افزایش آب دهان

➤ کاربامازپین حساسیت پوستی

➤ کلونازپام: خواب آلودگی و تاری دید

➤ نیترازپام: سرگیجه، سردرد و احساس
خستگی مفرط

➤ لاموتریزن: جوش های پوستی و حساسیت
پوستی

➤ پریمیدون: اختلال دی، سرگیجه و

حساسیت پوستی

➤ استازولامید: سنگهای کلیوی

➤ دیازپام: خواب آلودگی، سرگیجه و خشم

➤ تترا: بی قراری و چاقی موقت.