

این پمپلت کمک می کند تا اطلاعاتی را در مورد پیشگیری از افتادن و زمین خوردن فرزندتان در بیمارستان به دست آورید.

• افتادن و زمین خوردن کودک در بیمارستان بیشتر از منزل اتفاق می افتد. چون محیط بیمارستان برای کودک شما ناآشناس است و ممکن است مدتی طول بکشد تا کودک در محیط جدید خود احساس راحتی بکند. همچنین ممکن است تحت تأثیر دارو ها خواب آلود باشد.

• علاوه بر این، بستری شدن در بیمارستان برای بسیاری از والدین استرس و اضطراب ایجاد میکند. این استرس می تواند منجر به حواس پرتی والدین شود.

چه زمانی احتمال افتادن کودک وجود دارد؟

- کودک ممکن است از تخت یا صندلی بیفتد.
- شیرخوار ممکن است از دستهای مادرهایی که خواب آلود هستند بیفتدند. یا موقع برداشتن شیرخوار از تخت از دست مادر بیفتد.
- ممکن است کودک موقع توالت رفتن زمین بخورد.
- یا زمانی که کودک از تخت پایین می آید.
- وقتی کسی مراقب کودک نیست.
- معمولاً در طول ساعتهای شلوغ شیفت صبح و شب اتفاق می افتد.

چگونه می توانم از سقوط فرزندم پیشگیری کنم؟

- کودکان برای راه رفتن پس از عمل جراحی و استفاده از عصا یا واکر نیاز به کمک دارند.
- کودک را با زنگ اخبار آشنا کنید تا در صورت نبود شما اگر وسایلی نیاز دارد پرستار را خبر کند.
- کودک را به حرکت آهسته تشویق کنید، مخصوصاً اگر داروی آرام بخش دریافت کرده است هنگام بلند شدن از تخت باید مراقب باشد.
- از فرزندتان بخواهید تا قبل از ایستادن دقایقی را در کنار تخت بنشیند و منتظر بماند اگر احساس سرگیجه نداشت بعد بایستد.
- اگر کودک شما احساس ضعف، سبکی سر یا گیجی دارد باید قبل از بلند شدن از رختخواب از شما یا پرستار کمک بخواهد.
- اگر پس از آرام بخشی یا بیهوشی راه رفتن کودک سخت است، از ویلچر استفاده کنید.
- کودک شما نباید برای تکیه دادن از هر چیزی که دارای چرخ است ، مانند یک پایه سرم استفاده کند.
- از کودک خود بخواهید که به هر دلیلی نیاز به بلند شدن از رختخواب داشت به شما یا پرستار اطلاع دهد.
- کودک شما نباید شبها به تنها یی از رختخواب بلند شود. بیمارانی که سعی می کنند در تاریکی راه بروند، اغلب زمین می خورند.



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذربایجان
راهنمای والدین

پیشگیری از افتادن و زمین خوردن کودک در بیمارستان



آموزش سلامت

تهیه و ترجمه: ناهید دهخدا

تاریخ تهیه: ۱۴۰۰/۰۳

آخرین بازنگری: ۱۴۰۱/۰۱



- اگر در هنگام ترجیح از بیمارستان مشخص شود کودک شما در منزل در خطر افتادن و زمین خوردن است به پزشک اطلاع دهید، ممکن است یک فیزیوتراپیست فرزند شما را معاینه کند تا اطمینان حاصل کنید که کودک می‌تواند با خیال راحت راه برود.



کودک را در
لبه پنجره
قرار ندهید.
ممکن است از
پنجره به
زمین بیفتد.

«این پمفت به عنوان راهنمای آموزشی والدین می‌باشد.
واحد آموزش سلامت تلاش می‌کند اطلاعات به روز و دقیقی در اختیار بیمار
و خانواده قرار دهد.

اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتماً با پزشک کودک مشورت کنید.»

- خم شدن ممکن است باعث سرگیجه در کودک شود.
کودک شما برای برداشتن چیزی از زمین نباید خم شود.

- شلوار و لباس خواب کودک باید بالای مج پا باشد.
اگر کودک شما برای رفتن به دستشویی خیلی ضعیف است، از کمک پرستار یک لگن توالت درخواست کنید.

- در صورت مشاهده منطقه لغزنه که می‌تواند باعث لیز خوردن و افتادن فرزند شما یا شخص دیگری شود، به پرستار اطلاع دهید.

- در مورد داروهایی که می‌توانند خطر خواب آلودگی و زمین خوردن را افزایش دهند با پزشک، داروساز یا پرستار کودک خود صحبت کنید.

اگر فرزندم زمین افتاد چه کاری انجام دهم؟

- باید پرستار را فوراً مطلع کنید.
پرستار منطقه را ایمن کرده و به کودک شما رسیدگی می‌کند.

- کودک شما توسط پزشک بخش معاینه می‌شود.
در صورت صلاحیت پزشک، عکسبرداری انجام می‌شود.

- پرستار یک فرم حادثه را برای گزارش تکمیل می‌کند.
این گزارش با شناسایی و حذف خطرات به جلوگیری از زمین خوردن فرزندتان در آینده کمک می‌کند.

منابع:

*Falls Prevention for Children in Hospital: Information for Parents and Carer Released September 2014, © Clinical Excellence Commission 2014.

* Paediatric Fall and Entrapment Prevention and Management Guideline Version 1.0, October 2020.